


## Hablando con su profesional de la salud sobre COBENFY

Si es un adulto con esquizofrenia y está presentando síntomas, lleve esta guía a su profesional de la salud para analizar si COBENFY es adecuado para usted.

### En general, ¿cómo se siente respecto a su tratamiento actual para la esquizofrenia?



### Observe cualquier síntoma que está presentando o ha presentado recientemente

Los sentimientos positivos son experiencias adicionales creadas por su cerebro. Estas pueden incluir alucinaciones (escuchar o ver cosas que no son reales), delirios (establecer creencias que no son ciertas o basadas en la realidad) o dificultad para pensar o hablar.

#### ¿Cuánto le afectan los síntomas positivos?

- Un poco
- Moderado
- Mucho

Los síntomas negativos son como piezas que se pierden de su personalidad. Estas pueden incluir falta de motivación, disminución del sentido de alegría o felicidad, mostrar poca emoción y aislamiento social.

#### ¿Cuánto le afectan los síntomas negativos?

- Un poco
- Moderado
- Mucho

#### ¿Está presentando algunos de los siguientes desafíos?

- Manejo de síntomas positivos
- Manejo de síntomas negativos
- Manejo de efectos secundarios
- No sentirse apoyado
- Otras situaciones:

---

---

#### ¿Está presentando alguna situación que afecta su capacidad para tomarse su medicamento?

---

---

#### ¿Cuáles son sus objetivos al considerar un tratamiento??

Por ejemplo "Comenzar a mejorar mis síntomas"

---

o "Conectarme con familiares y amistades"

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Las siguientes son algunas preguntas que puede hacerle a su profesional de la salud:

- ¿Cómo funciona COBENFY?
- ¿Cómo pudiera COBENFY ayudarme con mis síntomas?
- ¿Qué efectos secundarios pudiera esperar de COBENFY?
- ¿Qué apoyo hay disponible si tomo COBENFY?

**Pregúntele a su profesional de la salud si COBENFY pudiera ser adecuado para usted.**

### ¿QUÉ ES COBENFY (co-BEN-fee)?

COBENFY es un medicamento recetado oral usado para tratar la esquizofrenia en adultos. No se conoce si COBENFY es seguro y eficaz en niños.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

#### No tome COBENFY si:

- tiene problemas de retención urinaria que hacen que su vejiga no se vacíe por completo o no se vacíe del todo
- tiene problemas (deterioro) hepáticos moderados o severos
- tiene problemas de retención gástrica que hacen que su estómago se vacíe con lentitud
- presenta alergia a COBENFY, xanomeline o al cloruro de trospio, o a alguno de los ingredientes de COBENFY
- tiene un problema ocular conocido como glaucoma de ángulo estrecho no tratado

#### Antes de tomar COBENFY, informe a su profesional de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si:

- tiene agrandamiento de la próstata, problemas para orinar o bloqueo de la vejiga urinaria
- tiene problemas hepáticos
- tiene o ha tenido cálculos biliares o problemas con los conductos biliares o el páncreas
- tiene problemas estomacales o intestinales, como estreñimiento, colitis ulcerosa, vaciamiento lento de su estómago o miastenia grave
- tiene un padecimiento ocular conocido como glaucoma de ángulo estrecho
- tiene problemas renales
- está embarazada o tiene planes de estarlo. No se conoce si COBENFY puede causar daño al feto. Informe a su profesional de la salud si queda embarazada o piensa que está embarazada durante el tratamiento con COBENFY.
  - Hay un registro de exposición en el embarazo para mujeres que toman COBENFY durante el embarazo. El propósito de este registro es obtener información sobre la salud de mujeres expuestas a COBENFY y sus bebés. Si queda embarazada durante el tratamiento con COBENFY, su profesional de la salud la inscribirá llamando al 1-866-961-2388 o en línea en <https://womensmentalhealth.org/research/pregnancyregistry/atypicalantipsychotic/>
- está lactando o tiene planes de lactar. No se conoce si COBENFY pasa a la leche materna o si puede causar daño al infante.

#### Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados y su receta, vitaminas y suplementos herbarios. Tomar COBENFY con determinados medicamentos puede aumentar el riesgo de efectos secundarios a causa de COBENFY o los otros medicamentos pueden afectar la manera en que COBENFY u otros medicamentos funcionan. Conozca los medicamentos que usa. Tenga una lista de estos para mostrarla a su profesional de la salud o farmacéutico cuando adquiera un medicamento nuevo.

#### ¿Qué debo evitar mientras tomo COBENFY?

**No** conduzca, opere maquinaria pesada ni participe de otras actividades peligrosas hasta tanto sepa cómo le afecta COBENFY. COBENFY puede causar mareo, confusión, ver u oír cosas que no son reales (alucinaciones) y somnolencia.

#### COBENFY puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

##### • Problemas de vaciamiento de su vejiga urinaria (retención urinaria). Consulte "No tome COBENFY si:"

COBENFY puede causar que su vejiga no se vacíe por completo o no se vacíe del todo. Corre un mayor riesgo de retención urinaria si es de mayor edad, tiene bloqueo de la vejiga urinaria, tiene agrandamiento de la próstata, conocido como hiperplasia prostática benigna (HPB), tiene problemas de vaciamiento de la vejiga urinaria a causa de diabetes o toma dosis altas de COBENFY. La retención urinaria puede aumentar el riesgo de contraer una infección del tracto urinario. Llame a su profesional de la salud o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta algún signo o síntoma de retención urinaria durante el tratamiento con COBENFY, como:

- dificultad urinaria
- vejiga llena y dificultad para vaciarla
- chorro de orina débil o goteo
- dolor al orinar
- orinar con frecuencia

##### • Riesgos en personas con problemas hepáticos. Consulte "No tome COBENFY si:"

No se recomienda que personas con problemas (deterioro) hepáticos leves tomen COBENFY pues corren un mayor riesgo de adquirir efectos secundarios a causa de COBENFY. Su profesional de la salud verificará los niveles de enzimas hepáticas en la sangre antes de comenzar el tratamiento y según sea necesario durante el tratamiento con COBENFY. Informe a su profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de problemas hepáticos durante el tratamiento con COBENFY, como:

- color amarillento de la piel o parte blanca de los ojos
- náuseas o vómitos
- orina oscura
- pérdida de apetito
- dolor e hinchazón en la parte derecha superior de su estómago (abdomen)
- fiebre
- escalofríos
- heces color claro
- cansancio

##### • Riesgos en personas con problemas de los conductos biliares y la vesícula biliar (enfermedad biliar). COBENFY puede

provocar bloqueo de los conductos biliares que pudiera conducir a piedras biliares, pancreatitis y aumento de las enzimas hepáticas. Su profesional de la salud verificará los niveles sanguíneos de enzimas hepáticas y bilirrubina antes de comenzar el tratamiento y según sea necesario durante el tratamiento con COBENFY. Informe a su profesional de la salud si tiene algún signo o síntoma de trastornos biliares durante el tratamiento con COBENFY, como:

- malestar o ardor estomacal (dispepsia)
- vómitos
- náuseas
- dolor en la parte derecha superior de su estómago

##### • Vaciamiento lento del estómago (disminución de la motilidad gastrointestinal). Consulte "No tome COBENFY si:"

Corre un mayor riesgo de presentar una disminución de la motilidad gastrointestinal si padece de colitis ulcerosa, tiene problemas de vaciamiento estomacal lento y padece de miastenia grave. Informe a su profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de disminución de la motilidad gastrointestinal durante el tratamiento con COBENFY, como:

- estreñimiento
- sensación de llenura después de comer solo algunos bocados
- vómitos
- náuseas
- reflujo ácido
- flatulencia estomacal (abdominal)
- dolor estomacal (abdominal)

##### • Reacciones alérgicas graves (angioedema).

Puede ocurrir angioedema durante el tratamiento con COBENFY que pudiera ser mortal. Deje de tomar COBENFY y llame a su profesional de la salud o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas de una reacción alérgica grave durante el tratamiento con COBENFY, como:

- ronchas
- ronquera o dificultad para hablar
- hinchazón de la cara, labios, boca o lengua
- problemas respiratorios
- hinchazón de la garganta

##### • Un problema ocular conocido como glaucoma de ángulo estrecho. Consulte "No tome COBENFY si:"

Si está padeciendo de ángulos estrechos en los ojos, COBENFY puede provocar un ataque repentino (cierres angular agudo) de glaucoma. Informe a su profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de glaucoma de ángulo estrecho durante el tratamiento con COBENFY, como:

- ojos rojizos
- náuseas o vómitos
- visión borrosa
- dolor de cabeza severo
- ver halos o colores brillantes alrededor de las luces
- dolor o malestar ocular

##### • Aumentos en el ritmo cardiaco. COBENFY puede aumentar el ritmo cardiaco (pulso).

Su profesional de la salud debe verificar su ritmo cardiaco antes de comenzar el tratamiento y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su profesional de la salud si presenta una sensación de latidos acelerados o palpitaciones en el pecho durante el tratamiento con COBENFY.

##### • Efectos secundarios en personas con problemas renales. Las personas con

problemas renales pueden presentar un aumento en el riesgo de sequedad de la boca, estreñimiento, malestar o ardor estomacal, infección del tracto urinario y retención urinaria durante el tratamiento con COBENFY.

##### • Problemas del sistema nervioso central. Consulte "¿Qué debo evitar mientras tomo COBENFY?"

#### Los efectos secundarios más frecuentes de COBENFY incluyen:

- náuseas
- diarrea
- malestar o ardor estomacal (dispepsia)
- aumento del ritmo cardiaco
- estreñimiento
- mareo
- vómitos
- acidez (reflujo gastrointestinal)
- presión arterial alta
- dolor estomacal (abdominal)

Puede que su profesional de la salud reduzca la dosis o detenga el tratamiento con COBENFY si presenta determinados efectos secundarios.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de COBENFY.

Llame a su médico para obtener consejo sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Consulte la [Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente.](#)



Cobenfy y el logotipo de Cobenfy son marcas comerciales de Karuna Therapeutics, Inc., una compañía de Bristol Myers Squibb. ©2024 Bristol-Myers Squibb Company. 1629-PR-2400005 12/24