



## Cómo comenzar COBENFY

Estamos aquí para ayudarle  
a lo largo de su trayectoria  
de tratamiento.

**COBENFY**<sup>™</sup>   
(xanomeline and trospium chloride) capsules  
50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg

## La experiencia COBENFY

En este folleto, encontrará:

- Cómo tomar COBENFY
- Información sobre sus dosis iniciales
- Posibles efectos secundarios
- Apoyo con COBENFY Cares™



Representación de actores.

### ¿Qué es COBENFY (co-BEN-fee)?

COBENFY es un medicamento recetado usado para tratar la esquizofrenia en adultos. No se conoce si COBENFY es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información de Seguridad Importante en este folleto y la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).

## Sienta el alivio de la mejoría de los síntomas de la esquizofrenia

En 2 estudios clínicos COBENFY\*:

-  Brindó **alivio significativo de los síntomas** vs. un placebo (píldora de azúcar)
-  Mostró una **mejora general en una variedad de síntomas**, incluidos los síntomas positivos, como alucinaciones y delirios, y los síntomas negativos, como la falta de interés o emoción

En 1 estudio clínico COBENFY†:

-  Redujo la **severidad general** de la esquizofrenia

COBENFY fue estudiado en dos estudios clínicos de 5 semanas de duración con 470 adultos entre las edades de 18 a 65 años diagnosticados con esquizofrenia. Los participantes tomaron COBENFY o una píldora de azúcar.

Los resultados individuales pueden variar.

\*Se usó otra escala de calificación de esquizofrenia para comparar cambios significativos en los síntomas generales. Estos síntomas incluyeron síntomas positivos, negativos y psicopatológicos generales.

†Se usó otra herramienta de calificación para la esquizofrenia para evaluar los cambios significativos generales en la severidad de la esquizofrenia.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

#### No tome COBENFY si:

- tiene problemas de retención urinaria que hacen que su vejiga no se vacíe por completo o no se vacíe del todo
- tiene problemas (deterioro) hepáticos moderados o severos

**COBENFY**   
(xanomeline and trospium chloride) capsules  
50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg



## Como tomar COBENFY

COBENFY se toma dos veces al día. Tome COBENFY tal y como recetado.



**1** píldora **al levantarse**



**1** píldora **antes de dormir**

Al menos **1 hora antes** o al menos **2 horas después** de una comida

COBENFY contiene xanomeline y cloruro de trospio.

COBENFY debe tomarse por boca con el estómago vacío. Comer demasiado cerca del momento de tomar COBENFY puede empeorar los efectos secundarios.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

#### No tome COBENFY si (continuación):

- tiene problemas de retención gástrica que hacen que su estómago se vacíe con lentitud
- presenta alergia a COBENFY, a xanomeline o al cloruro de trospio, o a alguno de los ingredientes de COBENFY
- tiene un problema ocular conocido como glaucoma de ángulo estrecho no tratado

Consulte la Información de Seguridad Importante en este folleto y la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).

COBENFY se toma 2 veces al día para ayudar a mantener niveles constantes de COBENFY en el cuerpo a lo largo del día.

**No cambie la dosis, no deje de tomar COBENFY sin hablar con su profesional de la salud ni abra las cápsulas.** Si toma demasiado COBENFY, llame a su profesional de la salud o al Centro de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222 o acuda a la sala de emergencia del hospital más cercano de inmediato.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

**Antes de tomar COBENFY, informe a su profesional de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si:**

- tiene agrandamiento de la próstata, problemas para orinar o bloqueo de la vejiga urinaria
- tiene problemas hepáticos
- tiene o ha tenido cálculos biliares o problemas con los conductos biliares o el páncreas



**COBENFY**<sup>®</sup>  
(xanomeline and trospium chloride) capsules  
50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg



## Cómo comenzar COBENFY

### 1. Dosis de inicio por al menos 2 días



50 mg/20 mg

Al comenzar COBENFY, la dosis recomendada es 50 mg/20 mg dos veces al día por al menos 2 días.

Las píldoras no se muestran en su tamaño real.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

**Antes de tomar COBENFY, informe a su profesional de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si (continuación):**

- tiene problemas estomacales o intestinales, como estreñimiento, colitis ulcerosa, vaciamiento lento del estómago o miastenia grave

**Consulte la Información de Seguridad Importante en este folleto y la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).**

### 2. Aumento de dosis por al menos 5 días



100 mg/20 mg

Luego, su profesional de la salud puede aumentar la dosis a 100 mg/20 mg dos veces al día por al menos 5 días.

### 3. Dosis continua



100 mg/20 mg



125 mg/30 mg

Su profesional de la salud determinará la dosis adecuada.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

**Antes de tomar COBENFY, informe a su profesional de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si (continuación):**

- tiene un padecimiento ocular conocido como glaucoma de ángulo estrecho
- tiene problemas renales

**COBENFY**<sup>®</sup>  
(xanomeline and tropisium chloride) capsules  
50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg



## Efectos secundarios posibles de COBENFY

Los efectos secundarios más frecuentes de COBENFY incluyen:

- Náusea
- Malestar o ardor estomacal (dispepsia)
- Estreñimiento
- Vómitos
- Presión arterial alta
- Dolor estomacal (abdominal)
- Diarrea
- Aumento del ritmo cardíaco
- Mareo
- Acidez (reflujo gastrointestinal)

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de COBENFY.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

**COBENFY puede causar efectos secundarios graves, incluidos:** Problemas de vaciamiento de la vejiga urinaria (retención urinaria), riesgos en personas con problemas hepáticos, riesgos en personas con problemas de los conductos biliares y de la vesicular biliar (enfermedad biliar), vaciamiento lento del estómago (disminución de la motilidad gastrointestinal), reacciones alérgicas graves (angioedema), un problema ocular conocido como glaucoma de ángulo estrecho, aumento en el ritmo cardíaco, efectos secundarios en personas con problemas renales y problemas del sistema nervioso central.

Consulte la Información de Seguridad Importante en este folleto y la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).



Si presenta náuseas o vómitos, pregunte a su profesional de la salud sobre las opciones que pudieran ayudar.

Puede que su profesional de la salud disminuya la dosis o suspenda el tratamiento con COBENFY si presenta determinados efectos secundarios.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

**Antes de tomar COBENFY, informe a su profesional de la salud sobre todos sus padecimientos, incluido si (continuación):**

- está embarazada o tiene planes de estarlo. No se conoce si COBENFY puede causar daño al feto. Informe a su profesional de la salud si queda embarazada o piensa que está embarazada durante el tratamiento con COBENFY.
  - Hay un registro de exposición en el embarazo para mujeres que toman COBENFY durante el embarazo. El propósito de este registro es obtener información sobre la salud de mujeres expuestas a COBENFY y sus bebés. Si queda embarazada durante el tratamiento con COBENFY, su profesional de la salud la inscribirá llamando al 1-866-961-2388 o en línea en <https://womensmentalhealth.org/research/pregnancyregistry/atypicalantipsychotic/>
- está lactando o tiene planes de lactar. No se conoce si COBENFY pasa a la leche materna o si puede causar daño al infante.

**COBENFY**   
 (xanomeline and trospium chloride) capsules  
 50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg



## Consejos para **mantenerse en el tratamiento**

- Es importante formar un hábito al tomar COBENFY
- Coloque su medicamento en un área visible, como la mesa de noche
- Programe recordatorios repetidos en su teléfono para tomar COBENFY



Inscríbase en el programa de apoyo COBENFY Cares™ para tener acceso a consejos adicionales que pueden ayudarle a tomar su medicamento a su hora. Conozca más en la página 14.

### **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA**

**Informe a su profesional de la salud sobre todos los medicamentos que usa**, incluidos los medicamentos recetados y sin receta, vitaminas y suplementos herbarios. Tomar COBENFY con determinados medicamentos puede aumentar el riesgo de efectos secundarios a causa de COBENFY o los otros medicamentos pueden afectar la manera en que COBENFY u otros medicamentos funcionan. Conozca los medicamentos que usa. Tenga una lista de estos para mostrarla a su profesional de la salud o farmacéutico cuando adquiera un medicamento nuevo.

**Consulte la Información de Seguridad Importante en este folleto y la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).**





## Lleve constancia de **sus síntomas**

Cada persona experimenta los síntomas de maneras distintas. Una parte importante del tratamiento es llevar constancia de estos.

Hemos creado un registro de síntomas que puede completar y llevarlo a su próxima cita para una conversación más informada.



Escanee el código QR para imprimir el Registro de Síntomas o acceda a [COBENFY.com/resources](https://COBENFY.com/resources).

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA

#### ¿Qué debo evitar mientras tomo COBENFY?

**No** conduzca, opere maquinaria pesada ni participe de otras actividades peligrosas hasta tanto sepa cómo le afecta COBENFY. COBENFY puede causar mareo, confusión, ver u oír cosas que no son reales (alucinaciones) y somnolencia.

Consulte la Información de Seguridad Importante en este folleto y la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).





COBENFY Cares™

ofrece apoyo pensando en usted



¿Desea recibir consejos para recordar tomarse su medicamento con regularidad? Pregunte a un Champion de COBENFY Cares sobre los métodos disponibles.

Una vez reciba una receta, es elegible para inscribirse en COBENFY Cares. Hay Champions\* disponibles 24/7 para:

- Ayudarlo a inscribirse en COBENFY Cares
- Responder preguntas frecuentes sobre COBENFY
- Proveer recursos para cuidadores que ayudan a personas que toman COBENFY
- Ofrecer apoyo en inglés, español y otros idiomas

\*Los Champions de COBENFY Cares están disponibles para proveer apoyo a los pacientes con una receta de COBENFY. Los Champions no brindan consejo ni atención médica. Los Champions de COBENFY Cares los provee Bristol Myers Squibb como un servicio. Los pacientes deben consultar sus preguntas respecto a sus padecimientos y opciones de tratamiento con sus profesionales de la salud.

Consulte los [términos y condiciones de COBENFY](#).

Inscríbese para recibir nuestra **tarjeta de copago**

Participantes elegibles pueden pagar tan poco como \$0<sup>†</sup>

Si posee seguro médico privado o comercial, puede ser elegible para pagar tan poco como \$0 al mes con la oferta de ahorros en el copago. Aplican ciertos términos y condiciones.



Escanee o llame al **1-877-COBENFY** (1-877-262-3639) para conocer más sobre ahorros y apoyo e inscribirse en COBENFY Cares.

<sup>†</sup>Los participantes elegibles pueden pagar tan poco como \$0 por un suministro de 30 días, sujeto al beneficio anual máximo de \$10,000. Pueden aplicar otras restricciones. El participante es responsable por los impuestos aplicables, si alguno. La oferta no es aplicable para copagos de \$0 o menores.

Consulte la **Información de Seguridad Importante** en este folleto y la **Información de Prescripción completa**, incluida la **Información para el Paciente**.

**COBENFY**   
(xanomeline and trospium chloride) capsules  
50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg



## Información De Seguridad Importante (continuación)

### COBENFY puede causar efectos secundarios graves, incluidos (continuación):

- **Problemas de vaciamiento de la vejiga urinaria (retención urinaria).** Consulte **“No tome COBENFY si:”** COBENFY puede causar que su vejiga no se vacíe por completo o no se vacíe del todo. Corre un mayor riesgo de retención urinaria si es de mayor edad, tiene bloqueo de la vejiga urinaria, tiene agrandamiento de la próstata, conocido como hiperplasia prostática benigna (HPB), tiene problemas de vaciamiento de la vejiga urinaria a causa de diabetes o toma dosis altas de COBENFY. La retención urinaria puede aumentar el riesgo de contraer una infección del tracto urinario. Llame a su profesional de la salud o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta algún signo o síntoma de retención urinaria durante el tratamiento con COBENFY, como:
  - dificultad urinaria
  - vejiga llena y dificultad para vaciarla
  - chorro de orina débil o goteo
  - dolor al orinar
  - orinar con frecuencia
- **Riesgos en personas con problemas hepáticos.** Consulte **“No tome COBENFY si:”** No se recomienda que personas con problemas (deterioro) hepáticos leves tomen COBENFY pues corren un mayor riesgo de adquirir efectos secundarios a causa de COBENFY. Su profesional de la salud verificará los niveles de enzimas hepáticas en la sangre antes de comenzar el tratamiento y según sea necesario durante el tratamiento con COBENFY. Informe a su profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de problemas hepáticos durante el tratamiento con COBENFY, como:

### • Riesgos en personas con problemas hepáticos. (continuación)

- color amarillento de la piel o la parte blanca de los ojos
- náuseas o vómitos
- orina oscura
- pérdida de apetito
- dolor e hinchazón en la parte derecha superior del estómago (abdomen)
- fiebre
- dolor estomacal que se propaga hacia la espalda o debajo del hombro derecho
- escalofríos
- heces color claro
- cansancio
- picor

### • Riesgos en personas con problemas de los conductos biliares y la vesícula biliar (enfermedad biliar).

COBENFY puede provocar bloqueo de los conductos biliares que pudiera conducir a piedras biliares, pancreatitis y aumento de las enzimas hepáticas. Su profesional de la salud verificará los niveles sanguíneos de enzimas hepáticas y bilirrubina antes de comenzar el tratamiento y según sea necesario durante el tratamiento con COBENFY. Informe a su profesional de la salud si tiene algún signo o síntoma de trastornos biliares durante el tratamiento con COBENFY, como:

- malestar o ardor estomacal (dispepsia)
- vómitos
- náuseas
- dolor en la parte derecha superior del estómago

Consulte la Información de Seguridad Importante en este folleto y la [Información de Prescripción completa](#), incluida la [Información para el Paciente](#).

**COBENFY**<sup>®</sup>  
(xanomeline and trospium chloride) capsules  
50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

### COBENFY puede causar efectos secundarios graves, incluidos (continuación):

- **Vaciamiento lento del estómago (disminución de la motilidad gastrointestinal).** Consulte “No tome COBENFY si:” Corre un mayor riesgo de presentar una disminución de la motilidad gastrointestinal si padece de colitis ulcerosa, tiene problemas de vaciamiento estomacal lento y padece de miastenia grave. Informe a su profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de disminución de la motilidad gastrointestinal durante el tratamiento con COBENFY, como:
  - estreñimiento
  - dolor estomacal (abdominal)
  - vómitos
  - sensación de llenura después de comer solo algunos bocados
  - náuseas
  - reflujo ácido
  - flatulencia estomacal (abdominal)
- **Reacciones alérgicas graves (angioedema).** Puede ocurrir angioedema durante el tratamiento con COBENFY que pudiera ser mortal. Deje de tomar COBENFY y llame a su profesional de la salud o busque ayuda de emergencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas de una reacción alérgica grave durante el tratamiento con COBENFY, como:
  - ronchas
  - ronquera o dificultad para hablar
  - hinchazón de la cara, labios, boca o lengua
  - problemas respiratorios
  - hinchazón de la garganta
- **Un problema ocular conocido como glaucoma de ángulo estrecho.** Consulte “No tome COBENFY si:” Si está padeciendo de ángulos estrechos en los ojos. COBENFY puede provocar un ataque repentino (cierre angular agudo) de glaucoma. Informe a su profesional de la salud si presenta algún signo o síntoma de glaucoma de ángulo estrecho durante el tratamiento con COBENFY, como:
  - ojos rojizos
  - dolor o malestar ocular
  - visión borrosa
  - náuseas o vómitos
  - ver halos o colores brillantes alrededor de las luces
  - dolor de cabeza severo

- **Aumentos en el ritmo cardiaco.** COBENFY puede aumentar el ritmo cardiaco (pulso). Su profesional de la salud debe verificar su ritmo cardiaco antes de comenzar el tratamiento y durante el tratamiento según sea necesario. Informe a su profesional de la salud si presenta una sensación de latidos acelerados o palpitaciones en el pecho durante el tratamiento con COBENFY.
- **Efectos secundarios en personas con problemas renales.** Las personas con problemas renales pueden presentar un aumento en el riesgo de sequedad de la boca, estreñimiento, malestar o ardor estomacal, infección del tracto urinario y retención urinaria durante el tratamiento con COBENFY.
- **Problemas del sistema nervioso central.** Consulte “¿Qué debo evitar mientras tomo COBENFY?”

### Los efectos secundarios más frecuentes de COBENFY incluyen:

- náusea
- dolor estomacal (abdominal)
- malestar o ardor estomacal (dispepsia)
- diarrea
- estreñimiento
- aumento del ritmo cardiaco
- vómitos
- mareo
- presión arterial alta
- acidez (reflujo gastrointestinal)

Puede que su profesional de la salud reduzca la dosis o detenga el tratamiento con COBENFY si presenta determinados efectos secundarios.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de COBENFY.

Llame a su médico para obtener consejo sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

**Para información de seguridad adicional, consulte la [Información de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente.](#)**

**COBENFY**   
 (xanomeline and trospium chloride) capsules  
 50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg

**COBENFY**<sup>™</sup>  
(xanomeline and trospium chloride) capsules  
50mg/20mg, 100mg/20mg, 125mg/30mg



Escanee para recibir apoyo  
con COBENFY Cares<sup>™</sup>

Cobenfy, Cobenfy Cares y el logotipo de Cobenfy son marcas comerciales de Karuna Therapeutics, Inc., una compañía de Bristol Myers Squibb. © 2024 Bristol-Myers Squibb Company. 1629-PR-2400011 12/24

